



## HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel

### **Goltix 700 SC**

wordt op basis van de volgende artikelen gewijzigd:

Artikel 31, 44, 45 en 75 Verordening (EG) 1107/2009

Artikel 4 Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Artikel 2, aanhef en onder e) en 11 Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

### **WIJZIGING VAN DE TOELATING**

#### 1. Vervanging WG/GA door WG

Het Wettelijk Gebruiksvoorschrift en de Gebruiksaanwijzing (WG/GA) vervallen en worden vervangen door het Wettelijk Gebruiksvoorschrift (WG), dat komt te luiden als vastgesteld in bijlage I.

#### 2. Aanduidingen en vermeldingen op de verpakking

a. Behalve de onder 1 bedoelde, alsmede de overige bij de Wet Milieugevaarlijke Stoffen en Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten voorgeschreven aanduidingen en vermeldingen moeten op de verpakking voorkomen:

- het Wettelijk Gebruiksvoorschrift  
De letterlijke tekst van het Wettelijk Gebruiksvoorschrift, opgenomen in Bijlage I
- bij het toelatingsnummer een cirkel met daarin de aanduiding W.1.

b. In aanvulling op het Wettelijk Gebruiksvoorschrift mag de toelatinghouder aanbevelingen, die geen onderdeel uitmaken van het Wettelijk Gebruiksvoorschrift, opnemen in het etiket. Deze aanbevelingen mogen niet tegenstrijdig mogen zijn met het Wettelijk Gebruiksvoorschrift.

#### 3. Respijtermijn

De respijtermijn om de bestaande voorraden te verwijderen, op te slaan, op de markt te brengen en te gebruiken, bedraagt:

- achttien maanden na de inwerkingtreding van dit besluit voor de verkoop en distributie
- vervolgens nog één jaar voor de verwijdering, de opslag en het gebruik van bestaande voorraden van de betrokken gewasbeschermingsmiddelen.

## **Inwerkingtreding**

**Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2013**

*Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 119, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 217, 6700 AE WAGENINGEN. Het Ctgb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld.*

Wageningen, 11 december 2012

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN  
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN,  
Voor deze,

Dr. A.T.C. Bosveld,  
Secretaris.

Aan:  
Aako B.V.  
Arnhemseweg 87  
3832 GK LEUSDEN

Bijlage: Wettelijk Gebruiksvoorschrift

## HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

**BIJLAGE I** bij het besluit d.d. 11 december 2012 tot wijziging van de toelating van het middel  
Goltix 700 SC, toelatingnummer 13089 N

### Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen
Bieten	voor opkomst	Eenjarige onkruiden	2 L/ha	1 per teeltcyclus	5 L/ha	-
	rond opkomst	Eenjarige onkruiden	2 L/ha <sup>1</sup>	2 per teeltcyclus		7 dagen
	na opkomst	Eenjarige onkruiden	0,5 - 1 L/ha <sup>2</sup>	4 per teeltcyclus		7 dagen
	na opkomst	Eenjarige onkruiden	3 L/ha <sup>3</sup>	1 per teeltcyclus		-
Rode biet	voor opkomst	Eenjarige onkruiden	3 L/ha	1 per teeltcyclus	4,5 L/ha	-
	na opkomst	Eenjarige onkruiden	1,5 L/ha <sup>4</sup>	1 per teeltcyclus		-
Tulp (onbedekte teelt)	rond en na opkomst	Eenjarige onkruiden	3 L/ha	1 per teeltcyclus	3 L/ha	-
Iris (onbedekte teelt)	na opkomst	Eenjarige onkruiden	3 L/ha	1 per teeltcyclus	3 L/ha	-
Narcis onbedekte teelt)	na opkomst	Eenjarige onkruiden	3 L/ha	1 per teeltcyclus	3 L/ha	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen
Lelie (onbedekte teelt)	rond opkomst	Eenjarige onkruiden	3 L/ha	1 per teeltcyclus	5 L/ha	-
	na opkomst	Eenjarige onkruiden	0,5 - 1 L/ha <sup>1</sup>	4 per teeltcyclus		-
Lelie (bedekte teelt)	na opkomst	Eenjarige onkruiden	2 L/ha	1 per teeltcyclus en 2x per 12 maanden	5 L/ha	-
	na opkomst	Eenjarige onkruiden	1 L/ha <sup>5</sup>			-
Afrikaantjes	na opkomst	Eenjarige onkruiden	1 - 2 L/ha <sup>5</sup>	2 per teeltcyclus	5 L/ha	-

<sup>1</sup> In combinatie met 2 liter minerale olie per ha.

<sup>2</sup> In LDS-systeem in combinatie met toegelaten middelen.

<sup>3</sup> In combinatie met 5 liter minerale olie per ha.

<sup>4</sup> In combinatie met fenmedifam.

<sup>5</sup> In combinatie met toegelaten middelen.

### Toepassingsvoorwaarden

Mislukt een bietengewas door welke oorzaak dan ook (bijv. vorstschade of insectenvraat) dan kunnen na toepassing van Goltix 700 SC zonder grondbewerking weer bieten of krotten worden gezaaid. Maïs en aardappelen kunnen worden geteeld nadat de grond is geploegd.

Wanneer Goltix 700 SC is toegepast in de bedekte teelt van lelie, is het niet toegestaan om daarna groentegewassen te telen.