



HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

1 BESLUIT WIJZIGING TOEPASSINGSGEBIED AFGELEIDE TOELATING

Op 7 maart 2016 is van:

Aako B.V.
Postbus 205
3830 AE LEUSDEN

een uitbreiding afgeleide toelating gewasbeschermingsmiddel ontvangen voor het middel

Goltix 70 WG (nieuwe naam: AAKO Goltix 70 WG)

op basis van de werkzame stof(fen) metamitron.

HET COLLEGE BESLUIT tot wijziging van het toepassingsgebied van bovenstaand middel.

Alle bijlagen vormen een onlosmakelijk onderdeel van dit besluit.

Voor nadere gegevens over deze toelating wordt verwezen naar de bijlagen:

- Bijlage I voor details van de aanvraag en toelating.
- Bijlage II voor de etikettering.
- Bijlage III voor wettelijk gebruik.

1.1 Samenstelling, vorm en verpakking

De toelating geldt uitsluitend voor het middel in de samenstelling, vorm en de verpakking als waarvoor de toelating is verleend.

1.2 Gebruik

Het middel mag slechts worden gebruikt met inachtneming van hetgeen in bijlage III bij dit besluit is voorgeschreven.

1.3 Classificatie en etikettering

Mede gelet op de onder “wettelijke grondslag” vermelde wetsartikelen, dienen alle volgende aanduidingen en vermeldingen op de verpakking te worden vermeld:

- De aanduidingen, letterlijk en zonder enige aanvulling, zoals vermeld onder “verpakkingsinformatie” in bijlage I bij dit besluit.

12709 N

- Het toelatingsnummer met een cirkel met daarin de aanduiding van de W-codering zoals vermeld onder "toelatingsinformatie" in bijlage I bij dit besluit.
- De etikettering zoals opgenomen in bijlage II bij dit besluit.
- Het wettelijk gebruiksvoorschrift, letterlijk en zonder enige aanvulling, zoals opgenomen in bijlage III bij dit besluit.
- Overige bij wettelijk voorschrift voorgeschreven aanduidingen en vermeldingen.

2 WETTELIJKE GRONDSLAG

Besluit	artikel 45 Verordening (EG) 1107/2009.
Classificatie en etikettering	artikel 31 en artikel 65 Verordening (EG) 1107/2009.

3 BEOORDELING

Een afgeleide toelating is een toelating voor een middel dat op grond van een ander toelatingsbesluit in dezelfde samenstelling onder een andere handelsnaam voor een zelfde doeleinde is toegelaten.

Het middel Goltix 70 WG is een afgeleide toelating van het middel Goltix WG (8629 N). Bij besluit van 19 februari 2016 is het gebruiksgebied van Goltix WG (8629 N) gewijzigd. Op grond hiervan kan ook de toelating voor Goltix 70 WG worden gewijzigd.

Aako B.V. heeft bij de aanvraag een verklaring van geen bezwaar overgelegd van de toelatinghouder ADAMA Registrations B.V. van het middel Goltix WG .

Tevens verzoekt de toelatinghouder om de naam van Goltix 70 WG aan te passen in AAKO Goltix 70 WG.

Het college honoreert het verzoek.

Bezwaarmogelijkheid

Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 4 van Bijlage 2 bij de Algemene wet bestuursrecht en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 8030, 6710 AA, EDE. Het Ctgb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld.

Ede, 25 maart 2016

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN,
voor deze:
de secretaris,

dr. ir. L.P. van Duijn

BIJLAGE I DETAILS VAN DE AANVRAAG EN TOELATING**1 Aanvraaginformatie**

Aanvraagnummer: 20160363 UAG
 Type aanvraag: uitbreiding afgeleide toelating
 gewasbeschermingsmiddel
 Middelnamen: Goltix 70 WG
 Formele registratiedatum: * 7 maart 2016

* Datum waarop zowel de aanvraag is ontvangen als de aanvraagkosten zijn voldaan.

2 Stofinformatie

<u>Werkzame stof</u>	<u>Gehalte</u>
metamitron	70%

3 Toelatingsinformatie

Toelatingsnummer: 12709 N
 Expiratiedatum: 31-08-2016
 Afgeleide of parallel: Afgeleide toelating
 Biocide, gewasbeschermingsmiddel of
 toevoegingsstof: Gewasbeschermingsmiddel
 Gebruikers: Professioneel

W-coderingen en aflever- en opgebruiktermijnen:

- *W-codering professioneel gebruik:* 3
- *Vorige w-codering professioneel gebruik:* 2
- *Aflevertermijn professioneel gebruik:*
- *Opgebruiktermijn professioneel gebruik:*

- *W-codering niet-professioneel gebruik:*
- *Vorige w-codering niet-professioneel gebruik:*
- *Aflevertermijn niet-professioneel gebruik:*
- *Opgebruiktermijn niet-professioneel gebruik:*

4 Verpakkingsinformatie

Aard van het preparaat:
 granulaat of korrel

BIJLAGE II Etikettering van het middel Goltix 70 WG

Professioneel gebruik

de identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel:	
Pictogram	GHS07 GHS09
Signaalwoord	WAARSCHUWING
Gevarenaanduidingen	H302 Schadelijk bij inslikken. H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen	P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. P280C Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen. P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar SP 1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.
Aanvullende etiketelementen	EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
Kinderveilige sluiting verplicht	Nee
Voelbare gevaarsaanduiding verplicht	Nee

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

BIJLAGE III WG van het middel

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Maximaal aantal kg middel per ha per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Bieten	voor opkomst	eenjarige onkruiden	2 - 6 kg/ha ¹	1	8 kg/ha	-
	rond opkomst	eenjarige onkruiden	2 kg/ha ²	1		-
	na opkomst	eenjarige onkruiden	1,5 kg/ha ³	2		7
		eenjarige onkruiden	3 kg/ha ²	1		-
		eenjarige onkruiden	0,5 – 1 kg/ha ⁴	6		7
Rode biet	voor opkomst	eenjarige onkruiden	2 - 6 kg/ha ¹	1	8 kg/ha	-
	rond opkomst	eenjarige onkruiden	2 kg/ha ²	1		-
	na opkomst	eenjarige onkruiden	1,5 kg/ha ³	2		7
		eenjarige onkruiden	0,5 – 1 kg/ha ⁴	6		7
Bloembol- en bloemknolgewassen (onbedekte teelt) m.u.v. lelie	na opkomst	eenjarige onkruiden	3-4 kg/ha ¹	1	4 kg/ha	-
			0,5 kg/ha ⁴	8		7
Lelie	rond opkomst of na opkomst	eenjarige onkruiden	3-4 kg/ha ⁵	2	6 kg/ha	7
			0,5 kg/ha ⁴	12		7
Bloembol en bloemknolgewassen (bedekte teelt)	rond opkomst of na opkomst	eenjarige onkruiden	1 - 2 kg/ha ⁶	2	4 kg/ha	7
Afrikaantjes	na opkomst	eenjarige onkruiden	1 - 2 kg/ha ³	2	4 kg/ha	-

¹ Dosering afhankelijk van de grondsoort

² In combinatie met 2 liter per ha minerale of plantaardige olie.

³ In combinatie met een middel op basis van fenmedifam.

⁴ In LDS-systeem in combinatie met toegelaten middelen.

⁵ Voor de dosering van 3 liter geldt dat deze toegepast kan worden in combinatie met 5 liter per ha minerale of plantaardige olie.

⁶ De lage dosering in combinatie met toegelaten middelen.

Het gebruik in de teelt van aardbei, oregano voor etherische oliën, Aconitum, Astilbe, Campanula, Delphinium, Helianthus annuus, Lysimachia, Phlox, Peonia (voor opkomst), Solidago en vaste planten en bloemenzaadteelt is op basis van een “derdenuitbreiding”. Deze “derdenuitbreiding” is aangevraagd door de Stichting Trustee Bijzondere Toelatingen. Er is voor uitbreiding geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Het gebruik in de teelt van Peonia (na opkomst) is beoordeeld conform de “vereenvoudigde uitbreidingsprocedure”. Er is/zijn voor deze toepassing/toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in dit/deze toepassingsgebied(en), komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Maximaal aantal kg middel per ha per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen
Aardbei (opkweek, vermeerdering en wachtbedden)	na uitplanten	eenjarige onkruiden	0,5 – 1 kg/ha ¹	1	4 kg/ha	-
	na uitplanten	eenjarige onkruiden	0,5 kg/ha ¹	6		7
Oregano voor etherische oliën (onbedekte teelt)	na opkomst of na planten	eenjarige onkruiden	0,5 - 2 kg/ha ³	3	6 kg/ha	10
Aconitum, Astilbe, Campanula, Delphinium, Helianthus annuus, Lysimachia, Phlox, en Solidago (onbedekte teelt)	voor opkomst	eenjarige onkruiden	3 kg/ha ²	1	3,5 kg/ha	-
	na opkomst	eenjarige onkruiden	0,5 kg/ha ²	1		-
Peonia (onbedekte teelt)	voor opkomst	eenjarige onkruiden	3 kg/ha ²	1	3,5 kg/ha	-
	na opkomst	eenjarige onkruiden	0,5 kg/ha ²	7		7
Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)	na opkomst	eenjarige onkruiden	1 - 2 kg/ha	1	2 kg/ha	-
Bloemenzaadteelt (onbedekte teelt)	voor opkomst	eenjarige onkruiden	3 kg/ha ²	1	3,5 kg/ha	-
	na opkomst	eenjarige onkruiden	0,5 kg/ha ²	1		-

¹ Eventueel in combinatie met fenmedifam.

² Eventueel in combinatie met toegelaten middelen.

³ Dosering afhankelijk van de grondsoort.

Toepassingsvoorwaarden

Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden toegepast in grondwaterbeschermingsgebieden.

Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is de toepassing in oregano uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van één van de onderstaande driftreducerende maatregelen:

- minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen of
- driftarme spuitdoppen + kantdop + luchtondersteuning.

Bij toepassing in een teelt rode bieten waarna hetzelfde jaar nog een volgteelt wordt geoogst, uitsluitend een eenmalige bespuiting met AAKO Goltix 70 WG uitvoeren of vóór de opkomst of na de opkomst van het gewas.

Mislukt een bietengewas door welke oorzaak dan ook (bijv. vorstschade of insectenvraat) dan kunnen na toepassing van AAKO Goltix 70 WG zonder grondbewerking weer bieten of krotten worden gezaaid. Maïs en aardappelen kunnen worden geteeld nadat de grond is geploegd.

Wanneer AAKO Goltix 70 WG is toegepast in de bedekte teelt van lelie, is het niet toegestaan om daarna groentegewassen te telen.

Niet in alle bloembollen en bloemknollen is veel ervaring opgedaan; een deel van het assortiment verdraagt AAKO Goltix 70 WG, een ander deel niet. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt.