

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

Actueel WG van het middel WOPRO OXAMYL 10%G, 15107 N

8 april 2016

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als aaltjesbestrijdingsmiddel / insectenbestrijdingsmiddelen door middel van een grondbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassings gebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden
Aardappelen	Volveldsbehandeling kort voor of tijdens poten	aaltjes	40 kg/ha	1 per teeltcyclus
	toplaagbehandeling kort voor poten		20 kg/ha	
	rijenbehandeling tijdens poten		10 kg/ha	
Bieten	rijenbehandeling tijdens zaaien	cystenaaltjes ¹	25 kg/ha	1 per teeltcyclus
		wortelknobbelaaltjes	15 kg/ha	
		vrijlevende aaltjes	10 kg/ha	
		kevers ² , springstaarten	7,5 kg/ha	
Aardbei (vermeerderingsvelden)	volveldsbehandeling kort voor planten	aaltjes	40 kg/ha	1 per 12 maanden
Spruitkool	volveldsbehandeling kort voor planten	aaltjes	40 kg/ha	1 per 12 maanden
Bospeen, waspeen en winterwortel	rijenbehandeling tijdens zaaien	aaltjes	10 kg/ha	1 per 12 maanden
	volveldsbehandeling kort voor of tijdens zaaien		40 kg/ha	
Lelie (onbedekte teelt)	Volvelds- of rijenbehandeling voor	aaltjes	40 kg/ha	1 per teeltcyclus

Toepassings gebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden
	of direct na planten			
Bloemisterijgewassen (grondgebonden teelten)	volveldsbehandeling kort voor planten	aaltjes	400 gram per are	1 per 12 maanden
Potplanten	potgrondbehandeling voor oppotten	aaltjes	40 gram per m ³ grond	1 per teeltcyclus
Boomkwekerijgewassen	volveldstoepassing kort voor zaaien of planten	aaltjes	40 kg/ha	1 per 12 maanden
Bloemenzaadteelt (onbedekte teelt)	volveldstoepassing kort voor zaaien	aaltjes	400 gram per are	1 per 12 maanden
	rijenbehandeling tijdens zaaien	aaltjes	0,5 gram per strekkende meter bij een rijafstand van 50 cm	1 per 12 maanden

¹ bietencystenaaltje (*Heterodera schachtii*, *Heterodera betae*)

² bietenkever (*Atomaria linearis*)

Het gebruik in de teelt van bieten (ter bestrijding van emelten en/of stengelaaltjes), witlof (pennenteelt), cichorei, zaaiui, eerstejaars plantui en de onbedekte opkweek van prei is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbehandeling uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassings gebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden
Bieten	rijenbehandeling tijdens zaaien	stengelaaltjes ¹ , emelten	15 kg/ha	1 per teeltcyclus

Toepassings gebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden
Witlof (pennenteelt)	rijenbehandeling tijdens zaaien	vrijlevende aaltjes	10 kg/ha	1 per teeltcyclus
Cichorei	rijenbehandeling tijdens zaaien	vrijlevende aaltjes	10 kg/ha	1 per teeltcyclus
Zaaiui	rijen- of zaaibedbehandeling tijdens zaaien	aaltjes	20 kg/ha	1 per teeltcyclus
Eerstejaars plantui	rijen-, of plantbedbehandeling tijdens planten	aaltjes	20 kg/ha	1 per teeltcyclus
Prei (opkweek, onbedekte teelt)	rijen- of zaaibedbehandeling tijdens zaaien	aaltjes	20 kg/ha	1 per 12 maanden

¹ *Ditylenchus dipsaci*

Toepassingsvoorwaarden

Om de vogels en zoogdieren te beschermen moet u gemorst product verwijderen.

Om de vogels en de zoogdieren te beschermen moet het product volledig in de bodem worden ondergewerkt; zorg ervoor dat het product ook aan het voerend is ondergewerkt.