

Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik

## HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

**BIJLAGE I** bij het besluit d.d. 16 januari 2015 tot uitbreiding van de toelating van het middel Dual Gold 960 EC, toelatingnummer 12096 N

### Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie juni 2010) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassings-gebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids-termijn in dagen
Bieten	Na-opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,5 – 1 l/ha <sup>1</sup>	2	1,5 l/ha	7	-
Maïs	Voor-opkomst	Eenjarige grasachtige onkruiden	1,6 l/ha	1	1,6 l/ha	-	-
	Na-opkomst	Eenjarige onkruiden	0,9 l/ha <sup>2</sup>	1			
Witlof (pennenteelt)	Na-opkomst	Eenjarige onkruiden	0,1 – 0,3 l/ha <sup>1</sup>	6	1,3 l/ha	5	-
Cichorei	Na-opkomst	Eenjarige onkruiden	0,1 – 0,3 l/ha <sup>1</sup>	6	1,3 l/ha	5	-
Boon met peul (onbedekte teelt)	Voor-opkomst <sup>3</sup>	Eenjarige onkruiden	1 l/ha	1	1 l/ha	-	-
Uien	Na-opkomst	Eenjarige onkruiden	0,75 l/ha	2	1,5 l/ha	7	-
	Na-opkomst	Eenjarige onkruiden	0,5 l/ha <sup>1</sup>	3		5	
Sjalotten	Na-opkomst	Eenjarige onkruiden	0,75 l/ha	2	1,5 l/ha	7	-
	Na-	Eenjarige	0,5 l/ha <sup>1</sup>	3		5	

	opkomst	onkruiden					
Lelie (onbedekte teelt, vermeerderingsteelt)	Rond opkomst	Eenjarige onkruiden	1,5 l/ha	1	1,5 l/ha	-	-
Tulp (onbedekte teelt, vermeerderingsteelt)	Rond opkomst	Eenjarige onkruiden	1,5 l/ha	1	1,5 l/ha	-	-

<sup>1</sup> in LDS-systeem in combinatie met toegelaten middelen

<sup>2</sup> in combinatie met toegelaten middel

<sup>3</sup> in verband met kans op fytoxiciteit toepassen binnen 2 dagen na zaaien

Het gebruik in de teelt van teunisbloem, de onbedekte teelt van aardbei, knoflook, aromatische wortelgewassen, gladiool (onbedekte teelt), liatris (onbedekte teelt), 2-jarige rozen (onbedekte teelt), 2-jarige vruchtbomen (onbedekte teelt), Fagus (onbedekte teelt), vaste plantenteelt (onbedekte teelt), veredeling en zaadteelt (bedekte teelt), onbedekte teelt van: Veredeling en bloemenzaadteelt, groentenzaadteelt en zaadteelt van kruiden, bieten, peulvruchten, oliehoudende zaden, vezelgewassen, groenbemestersgewassen, voedergewassen en witlof, cichorei, boekweit en meekrap, is op basis van een “derdenuitbreiding” en is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Deze “derdenuitbreiding” is aangevraagd door de Stichting Trustee Bijzondere Toelatingen. Er is voor deze uitbreiding geen werkzaamheids- en fytoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheids-termijn in dagen
Teunisbloem	Voor- en na-opkomst	Eenjarige onkruiden	0,75 l/ha	2	1,5 l/ha	7	-
	Na-opkomst		0,5 l/ha	3		5	-
Aardbei (onbedekte teelt)	na uitplanten	Eenjarige onkruiden	0,7 l/ha	2	1,4 l/ha	7	28
Knoflook	Voor en na-opkomst	Eenjarige onkruiden	0,75 l/ha	2	1,5 l/ha	7	-
	Na-opkomst	Eenjarige onkruiden	0,5 l/ha <sup>1</sup>	3		5	

Aromatische wortelgewassen	Na-opkomst	Eenjarige onkruiden	0,1 – 0,3 l/ha <sup>2</sup>	6	1,3 l/ha	5	-
Gladiool (onbedekte teelt)	Rond opkomst	Eenjarige onkruiden	1,5 l/ha	1	1,5 l/ha	-	-
Liatris (onbedekte teelt)	Na-opkomst	Eenjarige onkruiden	0,5 l/ha	3	1,5 l/ha	5	-
2-jarige rozen (onbedekte teelt)	Bodemtoepassing <sup>1</sup>	Eenjarige onkruiden	0,75 – 1,5 l/ha	2	1,5 l/ha	10	
2-jarige vruchtbomen (onbedekte teelt)	Bodemtoepassing <sup>1</sup>	Eenjarige onkruiden	0,75 – 1,5 l/ha	2	1,5 l/ha	10	
Fagus (onbedekte teelt)	Bodemtoepassing <sup>1</sup>	Eenjarige onkruiden	0,75 – 1,5 l/ha	2	1,5 l/ha	10	
Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)	Voor opkomst	Eenjarige onkruiden	0,75 – 1,5 l/ha	2	1,5 l/ha	10	
Veredeling en zaadteelt (bedekte teelt)	Voor- en na-opkomst	Eenjarige onkruiden	0,75 l/ha	2	1,5 l/ha	7	-
	Na-opkomst		0,5 l/ha	3		5	-
Onbedekte teelt van: Veredeling en bloemenzaadteelt, groentenzaadteelt en zaadteelt van kruiden, bieten, peulvruchten, oliehoudende zaden, vezelgewassen, groenbemestersgewassen, voedergewassen en witlof, cichorei, boekweit en meekrap	Voor- en na-opkomst	Eenjarige onkruiden	0,75 l/ha	2	1,5 l/ha	7	-
	Na-opkomst		0,5 l/ha	3		5	-

<sup>1</sup>Bodemgerichte bespuiting onder de beplanting, waarbij het blad en/of de stam niet geraakt worden

<sup>2</sup>In LDS-systeem in combinatie met toegelaten middelen

### Toepassingsvoorwaarden

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing uitsluitend toegestaan wanneer in perceelsstroken die grenzen aan oppervlaktewater in de eerste 14 m vanaf de insteek van de sloot gebruik wordt gemaakt van minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg uw leverancier van natuurlijke vijanden over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is toepassing uitsluitend toegestaan wanneer in perceelsstroken die niet grenzen aan oppervlaktewater in de eerste 14 m van het gewas, gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij, gebruik wordt gemaakt van minimaal 50% driftreducerende spuitdoppen.

In de teelt van droog te oogsten bonen, boon met peul, uien en sjalotten is niet uit te sluiten dat er enige groeivertraging en/of fytotoxiciteit optreedt.

In bloemenzaadteelt en liatris kan Dual Gold 960 EC worden toegepast vanaf het uitplantstadium van het gewas. Bij de zaadteelt van violen en enkele grofzadige soorten kan Dual Gold 960 EC zowel na zaai als na opkomst worden toegepast. Niet toepassen in *Nemophila* sp. en *Phlox drummondii*.