

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

Actueel WG van het middel Goltix SC, 12629 N

W.5

4 augustus 2017

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

| Toepassingsgebied | Type toepassing | Te bestrijden organisme | Dosering (middel) per toepassing | Maximaal aantal toepassing en per teeltcyclus of per 12 maanden | Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus | Minimum interval tussen toepassingen in dagen. |
|---|-----------------|---|----------------------------------|---|---|--|
| Bieten | voor opkomst | eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹ | 1,5-3 L/ha ² | 1 per teeltcyclus | 5 L/ha | - |
| | rond opkomst | eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹ | 2 L/ha ³ | 1 per teeltcyclus | | 14 ⁷ |
| | na opkomst | eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹ | 0,5-1 L/ha ⁴ | 6 per teeltcyclus | | 5 ⁸ |
| Afrikaantjes (<i>Tagetes</i>) als groenbemester | na opkomst | eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹ | 0,5-2 L/ha ² | 5 per teeltcyclus | 5 L/ha | 7 |
| Rode biet | voor opkomst | eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹ | 1,5-3 L/ha ² | 1 per teeltcyclus | 5 L/ha | - |
| | rond opkomst | eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹ | 2 L/ha ³ | 1 per teeltcyclus | | 14 ⁷ |
| | na opkomst | eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹ | 0,5-1 L/ha ⁴ | 6 per teeltcyclus | | 5 ⁸ |

| Toepassingsgebied | Type toepassing | Te bestrijden organisme | Dosering (middel) per toepassing | Maximaal aantal toepassing en per teeltcyclus of per 12 maanden | Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus | Minimum interval tussen toepassingen in dagen. |
|---|----------------------------|---|----------------------------------|---|---|--|
| Bloembol- en bloemknolgewassen m.u.v. lelie (onbedekte teelt) | rond opkomst en na opkomst | eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹ | 2 L/ha | 2 per teeltcyclus | 4 L/ha | 7 |
| Lelie (onbedekte teelt) | rond opkomst of na opkomst | eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹ | 2 L/ha | 1 per teeltcyclus | 5 L/ha | 7 |
| | na opkomst | eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹ | 0,5 L/ha ⁵ | 10 per teeltcyclus | | |
| Lelie (bedekte teelt) | rond opkomst en na opkomst | eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹ | 1-2 L/ha ⁶ | 2 per 12 maanden | 4 L/ha | 7 |

¹ Straatgras (*Poa annua*)

² Dosering afhankelijk van de grondsoort.

³ In combinatie met 2 liter per ha minerale of plantaardige olie.

⁴ LDS in combinatie met toegelaten middelen

⁵ LDS in combinatie met 5 liter per ha minerale of plantaardige olie.

⁶ De lage dosering in combinatie met toegelaten middelen.

⁷ Het minimum interval tussen de rond opkomst behandeling en de voorgaande voor opkomst behandeling is 14 dagen.

⁸ Het minimum interval tussen de eerste na opkomst behandeling en de voorgaande rond opkomst behandeling en tussen na opkomst behandelingen onderling is 5 dagen.

Toepassingsvoorwaarden

Om niet tot de doelsoorten behorende terrestrische planten te beschermen is toepassing in onbedekte teelten uitsluitend toegestaan wanneer gebruik wordt gemaakt van minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen en kantdoppen.

Mislukt een bietengewas door welke oorzaak dan ook (bijv. vorstschade of insectenvraat) en is Goltix SC toegepast dan zijn de mogelijkheden voor een volggewas beperkt:

- zonder grondbewerking kunnen bieten of krotten worden gezaaid;
- na ploegen kunnen maïs en aardappelen worden geteeld;

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof met amitron. Met amitron behoort tot de triazonen. De Hrac code is C1.

Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.