

Actueel WG van het middel Ascra Xpro, 15543 N

2 februari 2018

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus
Wintertarwe	Oogvlekkenziekte ¹ , bladvlekkenziekte ² , meeldauw ³ , DTR ⁴ , bruine roest ⁵ , gele roest ⁶ , kafjesbruin ⁷ , aarfusarium ⁸ , sneeuwschimmel ¹⁰ , scherpe-oogvlekkenziekte ¹¹	1,5 L/ha	1
Winterrogge	Oogvlekkenziekte ¹ , meeldauw ³ , bruine roest ⁵ , bladvlekkenziekte ⁹	1,5 L/ha	1
Triticale	Bladvlekkenziekte ² , meeldauw ³ , bruine roest ⁵ , kafjesbruin ⁷ , aarfusarium ⁸ , bladvlekkenziekte ⁹ , sneeuwschimmel ¹⁰ , scherpe-oogvlekkenziekte ¹¹	1,5 L/ha	1
Spelt	Bladvlekkenziekte ² , meeldauw ³ , bruine roest ⁵ , kafjesbruin ⁷ , aarfusarium ⁸ , bladvlekkenziekte ⁹ , sneeuwschimmel ¹⁰ , scherpe-oogvlekkenziekte ¹¹	1,5 L/ha	1
Zomertarwe	Oogvlekkenziekte ¹ , bladvlekkenziekte ² , meeldauw ³ , DTR ⁴ , bruine roest ⁵ , gele roest ⁶ , kafjesbruin ⁷ , sneeuwschimmel ¹⁰ , aarfusarium ⁸ , scherpe-oogvlekkenziekte ¹¹	1,5 L/ha	1
Zomerrogge	Oogvlekkenziekte ¹ , meeldauw ³ , bruine roest ⁵ , bladvlekkenziekte ⁹	1,5 L/ha	1

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

¹ Oogvlekkenziekte (*Pseudocercospora herpotrichoides*)

² Bladvlekkenziekte (*Septoria tritici*)

³ Meeldauw (*Blumeria graminis*)

⁴ DTR (*Pyrenophora tritici-repentis*)

⁵ Bruine roest (*Puccinia recondita*)

⁶ Gele roest (*Puccinia striiformis*)

⁷ Kafjesbruin (*Septoria nodorum*)

⁸ Aarfusarium (*Fusarium* spp.)

⁹ Bladvlekkenziekte (*Rhynchosporium secalis*)

¹⁰ Sneeuwschimmel (*Microdochium nivale*)

¹¹ Scherpe-oogvlekkenziekte (*Rhizoctonia cerealis*)

Overige toepassingsvoorwaarden

Het middel toepassen in 100-400 liter water per hectare.

Draag beschermende handschoenen bij werkzaamheden aan behandeld gewas.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stoffen bixafen, fluopyram en prothioconazool. Bixafen en fluopyram behoren tot de Succinate dehydrogenase inhibitors (SDHI-fungiciden). De Frac code is 7. Prothioconazool behoort tot de Demethylation Inhibitors (DMI-fungiciden). De Frac code is 3. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.