



## HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel

### **Oblix 500 SC**

wordt op basis van de volgende artikelen gewijzigd:

Artikel 31, 44, 45 en 75 Verordening (EG) 1107/2009

Artikel 4 Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Artikel 2, aanhef en onder e) en 11 Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

### **WIJZIGING VAN DE TOELATING**

#### 1. Vervanging WG/GA door WG

Het Wettelijk Gebruiksvoorschrift en de Gebruiksaanwijzing (WG/GA) vervallen en worden vervangen door het Wettelijk Gebruiksvoorschrift (WG), dat komt te luiden als vastgesteld in bijlage I.

#### 2. Aanduidingen en vermeldingen op de verpakking

a. Behalve de onder 1 bedoelde, alsmede de overige bij de Wet Milieugevaarlijke Stoffen en Nadere regels verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten voorgeschreven aanduidingen en vermeldingen moeten op de verpakking voorkomen:

- het Wettelijk Gebruiksvoorschrift  
De letterlijke tekst van het Wettelijk Gebruiksvoorschrift, opgenomen in Bijlage I
- bij het toelatingsnummer een cirkel met daarin de aanduiding W.8.

b. In aanvulling op het Wettelijk Gebruiksvoorschrift mag de toelatinghouder aanbevelingen, die geen onderdeel uitmaken van het Wettelijk Gebruiksvoorschrift, opnemen in het etiket. Deze aanbevelingen mogen niet tegenstrijdig mogen zijn met het Wettelijk Gebruiksvoorschrift.

#### 3. Respijtermijn

De respijtermijn om de bestaande voorraden te verwijderen, op te slaan, op de markt te brengen en te gebruiken, bedraagt:

- achttien maanden na de inwerkingtreding van dit besluit voor de verkoop en distributie
- vervolgens nog één jaar voor de verwijdering, de opslag en het gebruik van bestaande voorraden van de betrokken gewasbeschermingsmiddelen.

## **Inwerkingtreding**

**Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2013**

*Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken kan gelet op artikel 119, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt een bezwaarschrift indienen bij: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 217, 6700 AE WAGENINGEN. Het Ctgb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld.*

Wageningen, 11 december 2012

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN  
GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN,  
Voor deze,

Dr. A.T.C. Bosveld,  
Secretaris.

Aan:  
Agrichem B.V.  
Koopvaardijweg 9  
4906 CV OOSTERHOUT NB

Bijlage: Wettelijk Gebruiksvoorschrift

## HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

**BIJLAGE I** bij het besluit d.d. 11 december 2012 tot wijziging van de toelating van het middel Oblix 500 SC, toelatingnummer 10319 N

### Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Bieten	na opkomst	eenjarige onkruiden	0,6 l/ha <sup>1</sup>	2	2 l/ha	10
			1 l/ha <sup>2</sup>	1		-
			0,2 - 0,4 l/ha <sup>3</sup>	4		7
Engels- en Italiaans raaigras	over het gewas	eenjarige onkruiden	3-4 l/ha	1	4 l/ha per 12 maanden	-

<sup>1</sup> In combinatie met 3,5 l/ha fenmedifam (160 g/l).

<sup>2</sup> In combinatie met 5 l/ha fenmedifam (160 g/l).

<sup>3</sup> In LDS-systeem met toegelaten middelen.

Oblix 500 SC dient te worden toegepast 200-300 liter water per ha.

Het gebruik in de graszaadteelt (met uitzondering van Engels- en Italiaans raaigras) en de graszodenteelt, is beoordeeld conform de "vereenvoudigde uitbreidingsprocedure". Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitsonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Maximaal aantal liter middel per ha per 12 maanden
Graszaadteelt (m.u.v. Engels- en Italiaans raaigras)	Over het gewas	Duist, windhalm, straatgras, muur en herderstasje	3-4 l/ha	1	4 l/ha per 12 maanden
Graszodenteelt	over het gewas	Duist, windhalm, straatgras, muur	3-4 l/ha	1	4 l/ha per 12 maanden

Oblix 500 SC dient te worden toegepast 200-300 liter water per ha.

#### **Toepassingsvoorwaarden**

Na gebruik in de teelt van graszaad en graszoden het gras/hooi niet vervoederen.

De totale dosering in één seizoen mag niet hoger zijn dan 2 kg ethofumesaat (als werkzame stof) per hectare.

Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is toepassing in de graszaadteelt en graszodenteelt uitsluitend toegestaan indien gebruikt wordt gemaakt van driftarme spuitdoppen.

Voor bieten geldt dat tijdelijk enige gewasbeschadiging op kan treden, vooral bij kleine bietenplantjes.

Om schade te voorkomen als gevolg van eventuele residuen van ethofumesaat in de grond moet voor het zaaien of planten eerst kerend worden geploegd, bijvoorbeeld bij een nateelt van wintergranen of bij een mislukte teelt. Bij mislukken van een gewas waarin Oblix 500 SC werd toegepast kunnen de volgende gewassen na kerend ploegen gezaaid of geplant worden: suiker- en voederbieten, maïs, bruine bonen, tuinbonen, raaigrassen, erwten, spinazie, knolselderij, wortelen, zaai- en plantuien.