

2 mei 2014

TEPPEKI, toelatingnummer 12757 N

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als insectenbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Aardappelen	bladluis ¹	0,16 kg/ha	2 per teeltcyclus	21	14
Wintertarwe	bladluis	0,14 kg/ha	2 per teeltcyclus	21	28
Triticale	bladluis	0,14 kg/ha	2 per teeltcyclus	21	28
Spelt	bladluis	0,14 kg/ha	2 per teeltcyclus	21	28
Zomertarwe	bladluis	0,14 kg/ha	2 per teeltcyclus	21	28
Pitvruchten	bladluis	0,14 kg/ha	3 per 12 maanden	21	21
Bloembol- en bloemknolgewassen	bladluis	0,14 kg/ha	3 per 12 maanden	21	-
Bloemisterijgewassen	bladluis	0,14 kg/ha	3 per 12 maanden	21	-
Boomkwekerijgewassen	bladluis	0,14 kg/ha	3 per 12 maanden	21	-
Vaste plantenteelt	bladluis	0,14 kg/ha	3 per 12 maanden	21	-
Bloemenzaadteelt	bladluis	0,14 kg/ha	3 per 12 maanden	21	-
Veredelingsteelt en basiszaadproductie van akkerbouw- en groentegewassen (bedekte teelt)	bladluis	0,14 kg/ha	3 per 12 maanden	21	-
Openbaar groen	bladluis	0,14 kg/ha	3 per 12 maanden	21	-
Vruchtbomen en struiken van pitvruchten	bladluis	0,14 kg/ha	3 per 12 maanden	21	-

¹ wegedoornluis (*Aphis nasturtii*), groene perzikluis (*Myzus persicae*), aardappeltopluis (*Macrosiphum euphorbiae*), vuilboomluis (*Aphis frangulae*)

Toepassingsvoorwaarden

Voor zaadteelten geldt dat aangeraden wordt om op kleine schaal te toetsen of het middel van invloed is op de kiemkracht van het gewas of ras.

Dit middel bevat de werkzame stof flonicamid. Flonicamid behoort tot de pyridinecarboxamiden. De Irac code is 9. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

Dit middel is schadelijk voor niet-doelwit arthropoden in bedekte teelten. Vermijd onnodige blootstelling.

Gevaarlijk voor bijen en hommels. Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product op in bloei staande gewassen of op niet-bloeiende gewassen wanneer deze actief bezocht worden door bijen en hommels alleen toepassen na zonsondergang.

Gebruik is wel toegestaan op bloeiende planten in de kas mits er geen bijen of hommels in kas actief naar voedsel zoeken.”