

Actueel WG van het middel CONTANS, 12423 N

6 oktober 2017

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden
Akkerbouwgewassen (onbedekte teelt)	Grondbehandeling, voor of tijdens zaaien	Sclerotiënrot ^{1,2}	2 kg/ha	1
Aardappelen	Na de oogst behandeling, voor de koele bewaring	Sclerotiënrot ^{1,2}	50 g per 1000 kg aardappelen	1
Witlof (pennenteelt)	Na de oogst behandeling, voor de koele bewaring	Sclerotiënrot ^{1,2}	50 g per 1000 kg pennen	1
Groenteteelt	Grondbehandeling, voor of tijdens zaaien of planten	Sclerotiënrot ^{1,2}	4 kg/ha	1
Wortelen	Na de oogst behandeling, voor de koele bewaring	Sclerotiënrot ^{1,2}	50 g per 1000 kg wortelen	1

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden
Sierteeltgewassen	Grondbehandeling, voor of tijdens zaaien of planten	Sclerotiënrot ^{1,2}	4 kg/ha	1

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

¹ Sclerotiënrot (*Sclerotinia minor*)

² Sclerotiënrot (*Sclerotinia sclerotiorum*)

Overige toepassingsvoorwaarden

Voor de na-oogst behandeling dient 10-20 liter spuitvloeistof te worden gebruikt per 1000 kg aardappelen, witlofpennen of wortelen.

Inwerken in de grond voor landbouwgewassen tot 5 cm, voor groenteteelt en sierteeltgewassen tot 10 cm.

In de teelt van akkerbouwgewassen het middel toepassen in 150-400 L water /ha.

In de bedekte groenteteelt en de teelt van sierteeltgewassen het middel toepassen in 200-1200 L water /ha.

In de onbedekte groenteteelt het middel toepassen in 200-800 L water /ha.

In de teelt van sierteeltgewassen het middel toepassen in 200-1200 L water /ha.

Bevat *coniothyrium minitans* CON/M/91-8. Micro-organismen kunnen mogelijk sensibiliserende reacties veroorzaken.