

Actueel WG van het middel TEPPEKI, 12757 N

16 februari 2018

**W.7**

### **Wettelijk Gebruiksvoorschrift**

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als insectenbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidsstermijn in dagen of uiterst gewasstadium waarop toegepast mag worden
Aardappelen	bladluis <sup>1</sup>	0,16 kg/ha	2 per teeltcyclus	21	14
Suikerbieten	bladluis <sup>2</sup>	0,14 kg/ha	1 per teeltcyclus		60
Wintertarwe	bladluis	0,14 kg/ha	2 per teeltcyclus	21	28
Triticale	bladluis	0,14 kg/ha	2 per teeltcyclus	21	28
Spelt	bladluis	0,14 kg/ha	2 per teeltcyclus	21	28
Zomertarwe	bladluis	0,14 kg/ha	2 per teeltcyclus	21	28
Winterkoolzaad	bladluis <sup>3</sup>	0,10 kg/ha	1 per 12 maanden		BBCH 16-18 (6e tot 8ste bladstadium)
Pitvruchten	bladluis	0,14 kg/ha	3 per 12 maanden	21	21
Bloembol- en	bladluis	0,14 kg/ha	3 per 12	21	-

Toepassings- gebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidsstermijn in dagen of uiterst gewasstadium waarop toegepast mag worden
bloemknolgewassen			maanden		
Bloemisterijgewassen	bladluis	0,14 kg/ha	3 per 12 maanden	21	-
Boomkwekerijgewassen	Bladluis	0,14 kg/ha	3 per 12 maanden	21	-
Vaste plantenteelt	bladluis	0,14 kg/ha	3 per 12 maanden	21	-
Bloemenzaadteelt	bladluis	0,14 kg/ha	3 per 12 maanden	21	-
Veredelingsteelt en basiszaadproductie van akkerbouw- en groentegewassen	bladluis	0,14 kg/ha	3 per 12 maanden	21	-
Openbaar groen	bladluis	0,14 kg/ha	3 per 12 maanden	21	-
Vruchtbomen en struiken van pitvruchten	bladluis	0,14 kg/ha	3 per 12 maanden	21	-

<sup>1</sup> wegedoornluis (*Aphis nasturtii*), groene perzikluis (*Myzus persicae*), aardappeltopluis (*Macrosiphum euphorbiae*), vuilboomluis (*Aphis frangulae*)

<sup>2</sup> zwarte bonenluis (*Aphis fabae*), groene perzikluis (*Myzus persicae*)

<sup>3</sup> groene perzikluis (*Myzus persicae*)

### Toepassingsvoorwaarden

Draag geschikte handschoenen bij werkzaamheden aan behandeld gewas.

Voor zaadteelten geldt dat aangeraden wordt om op kleine schaal te toetsen of het middel van invloed is op de kiemkracht van het gewas of ras.

*Gevaarlijk voor bijen en hommels. Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product op in bloei staande gewassen of op niet-bloeiende gewassen wanneer deze actief bezocht worden door bijen en hommels alleen toepassen tussen zonsondergang en zonsopkomst.*

Gebruik is wel toegestaan in de kas mits er geen bijen of hommels actief naar voedsel zoeken. Voorkom dat bijen en andere bestuivende insecten de kas binnenkomen door bijvoorbeeld alle openingen met insectengaas af te sluiten.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden en bestuivers. Raadpleeg uw leverancier van natuurlijke vijanden over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden en/of bestuivers.

Resistentiemanagement:

Dit middel bevat de werkzame stof flonicamid. Flonicamid behoort tot de pyridinecarboxamiden. De Irac code is 29. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.