

**HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN**

Actueel WG van het middel AAKO Goltix 70 WG, 12709 N

**W.4**

31 augustus 2016

**WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT**

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Maximaal aantal kg middel per ha per jaar	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Bieten	voor opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras <sup>1</sup>	1,5 - 3 kg/ha <sup>2</sup>	1	5 kg/ha	-
	rond opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras <sup>1</sup>	2 kg/ha <sup>3</sup>	1		-
	na opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras <sup>1</sup>	0,5 - 2 kg/ha <sup>4</sup>	6		5
Rode biet	voor opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras <sup>1</sup>	1,5 - 3 kg/ha <sup>2</sup>	1	5 kg/ha	-
	rond opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras <sup>1</sup>	2 kg/ha <sup>3</sup>	1		-
	na opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras <sup>1</sup>	0,5 - 2 kg/ha <sup>4</sup>	6		5
Bloembol- en bloemknolgewassen (onbedekte teelt)	rond opkomst en na opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras <sup>1</sup>	2 - 4 kg/ha <sup>2</sup>	2	5 kg/ha	7
Lelies (onbedekte teelt)	rond opkomst en na opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras <sup>1</sup>	2 - 4 kg/ha <sup>2</sup>	2	5 kg/ha	7

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Maximaal aantal kg middel per ha per jaar	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
	na opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras <sup>1</sup>	0,5 - 1 kg/ha <sup>5</sup>	10		7
Bloembol- en bloemknolgewassen (bedekte teelt)	rond opkomst en na opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras <sup>1</sup>	1 - 2 kg/ha <sup>6</sup>	2	4 kg/ha	7

<sup>1</sup> Straatgras (*Poa annua*)

<sup>2</sup> Dosering afhankelijk van de grondsoort

<sup>3</sup> In combinatie met 2 liter per ha minerale of plantaardige olie.

<sup>4</sup> LDS in combinatie met olie.

<sup>5</sup> LDS in combinatie met 5 liter per ha minerale of plantaardige olie.

<sup>6</sup> De lage dosering in combinatie met toegelaten middelen.

Het gebruik in de teelt van tagetes, aardbei, oregano voor etherische oliën, zomerbloemen (onbedekte teelt), de vaste plantenteelt (onbedekt) en de bloemenzaadteelt (onbedekt) is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor uitbreiding geen werkzaamheid- en fytotoxiciteitsonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Maximaal aantal kg middel per ha per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Tagetes (groenbemester)	na opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras <sup>1</sup>	0,5 - 2 kg/ha <sup>2</sup>	5	5 kg/ha	7
Aardbei (onbedekte teelt)	na uitplanten	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras <sup>1</sup>	0,5 - 1 kg/ha	3	3 kg/ha	10

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Maximaal aantal kg middel per ha per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Oregano voor etherische oliën (onbedekte teelt)	na opkomst of na planten	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras <sup>1</sup>	0,5 - 2 kg/ha <sup>2</sup>	3	5 kg/ha	10
Zomerbloemen (onbedekte teelt)	voor opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras <sup>1</sup>	3 kg/ha <sup>3</sup>	1	5 kg/ha	-
	na opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras <sup>1</sup>	0,5 kg/ha <sup>3</sup>	9		7
Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)	na opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras <sup>1</sup>	0,5 - 2 kg/ha	10	5 kg/ha	7
Bloemenzaadteelt (onbedekte teelt)	voor opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras <sup>1</sup>	3 kg/ha <sup>3</sup>	1	5 kg/ha	-
	na opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras <sup>1</sup>	0,5 kg/ha <sup>3</sup>	9		7

<sup>1</sup> Straatgras (*Poa annua*)

<sup>2</sup> Dosering afhankelijk van de grondsoort.

<sup>3</sup> Eventueel in combinatie met toegelaten middelen.

### Toepassingsvoorwaarden

Om de zoogdieren te beschermen is toepassing in de onbedekte teelt van lelies uitsluitend toegestaan voor BBCH 65 (volledige bloei, of koppen van het gewas).

Om niet tot de doelsoorten behorende terrestrische planten te beschermen is toepassing in de onbedekte teelten van bieten, rode biet, bloembol- en bloemknolgewassen, lelies, *Tagetes*, *Oregano*, zomerbloemen, vaste plantenteelt en bloemenzaadteelt uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen en een kantdop.

Om niet tot de doelsoorten behorende terrestrische planten te beschermen is toepassing in de onbedekte teelt van aardbei uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van minimaal 50% driftreducerende spuitdoppen en een kantdop, of minimaal 75% drift reducerende spuitdoppen.

12709 N

Mislukt een bietengewas door welke oorzaak dan ook (bijv. vorstschade of insectenvraat) en is AAKO Goltix 70 WG toegepast dan zijn de mogelijkheden voor een volggewas beperkt:

- zonder grondbewerking kunnen bieten of krotten worden gezaaid;
- na ploegen kunnen maïs en aardappelen worden geteeld;

#### Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof metamitron. Metamitron behoort tot de triazonen. De Hrac code is C1.

Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.