

3 april 2015

Actueel WG van het middel LONTREL 600, 14800 N

### Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

| Toepassingsgebied                   | Type toepassing             | Te bestrijden organisme          | Dosering (middel) per toepassing | Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden | Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden | Minimum interval tussen toepassingen in dagen |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| Bieten                              | na opkomst                  | breedbladige onkruiden           | 0,2 l/ha                         | 1 x per teeltcyclus  | 0,25 l/ha per teeltcyclus   | -   |
|                                     |                             | eenjarige breedbladige onkruiden | 0,08 l/ha*                       | 3 x per teeltcyclus  |   | 7   |
| Maïs                                | na opkomst                  | breedbladige onkruiden           | 0,2 l/ha                         | 1 x per teeltcyclus  | 0,2 l/ha per teeltcyclus  | -   |
| Koolzaad                            | na opkomst                  | breedbladige onkruiden           | 0,2 l/ha                         | 1 x per teeltcyclus  | 0,2 l/ha per teeltcyclus  | -   |
| Lijnzaad                            | na opkomst                  | breedbladige onkruiden           | 0,17 l/ha                        | 1 x per teeltcyclus  | 0,17 l/ha per teeltcyclus   | -   |
| Vezelvlas                           | na opkomst                  | breedbladige onkruiden           | 0,17 l/ha                        | 1 x per teeltcyclus  | 0,17 l/ha per teeltcyclus   | -   |
| Sluitkool (onbedekte teelt)         | na uitplanten of na opkomst | breedbladige onkruiden           | 0,17 l/ha                        | 1 x per teeltcyclus  | 0,17 l/ha per teeltcyclus   | -   |
|                                     |                             | eenjarige breedbladige onkruiden | 0,08 l/ha*                       | 2 x per teeltcyclus  |   | 10  |
| Bloemkoolachtigen (onbedekte teelt) | na uitplanten of na opkomst | breedbladige onkruiden           | 0,17 l/ha                        | 1 x per teeltcyclus  | 0,17 l/ha per teeltcyclus   | -   |

|  |  |  |            |                     |  |    |
|--|--|--|------------|---------------------|--|----|
|  |  | eenjarige<br>breedbladige<br>onkruiden | 0,08 l/ha* | 2 x per teeltcyclus |  | 10 |
|--|--|--|------------|---------------------|--|----|

\* LDS-systeem in combinatie met toegelaten middelen

Het gebruik in de onbedekte teelt voor bloemenzaad, de onbedekte teelt van meekrap en onbedekte teelt van brandnetel is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Het gebruik in de onbedekte teelt van wouw is op basis van een “derdenuitbreiding” en beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Deze “derdenuitbreiding” is aangevraagd door Stichting Trustee Bijzondere Toelatingen. Er is voor deze uitbreiding geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in dit toepassingsgebied, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

| Toepassings-<br>gebied                | Type<br>toepassing            | Te bestrijden<br>organisme             | Dosering<br>(middel) per<br>toepassing | Maximaal aantal<br>toepassingen per<br>teeltcyclus | Maximaal aantal<br>liter middel per ha<br>per teeltcyclus | Minimum interval<br>tussen toepassingen<br>in dagen |
|---------------------------------------|-------------------------------|--|--|--|---|---|
| Bloemenzaadteelt<br>(onbedekte teelt) | voor opkomst<br>of na opkomst | breedbladige<br>onkruiden              | 0,125-0,2 l/ha                         | 1  | 0,2 l/ha  | -   |
|                                       |                               | eenjarige<br>breedbladige<br>onkruiden | 0,08 l/ha*                             | 3  | 0,25 l/ha   | 7   |
| Meekrap<br>(onbedekte teelt)          | na uitplanten                 | breedbladige<br>onkruiden              | 0,2 l/ha                               | 1  | 0,2 l/ha  | -   |
|                                       |                               | eenjarige<br>breedbladige<br>onkruiden | 0,08 l/ha*                             | 3  | 0,25 l/ha   | 7   |
| Brandnetel<br>(onbedekte teelt)       | na opkomst                    | breedbladige<br>onkruiden              | 0,125-0,2 l/ha                         | 1  | 0,2 l/ha  | -   |
| Wouw                                  | Voor opkomst                  | breedbladige<br>onkruiden              | 0,125-0,2 l/ha                         | 1  | 0,2 l/ha  | -   |
|                                       | Na opkomst                    |  | 0,08 l/ha*                             | 3  | 0,25 l/ha   | 7   |

\* LDS-systeem in combinatie met toegelaten middelen

### **Toepassingsvoorwaarden**

Brandnetel mag niet voor menselijke consumptie worden gebruikt.

Restproducten uit de teelt van vezelvlas en brandnetel mogen niet worden vervoerd en/of in de handel gebracht.

Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is toepassing van het middel in de teelt van **maïs, koolzaad, lijnzaad, vezelvlas, sluitkool, bloemkoolachtigen, bloemenzaadteelt, meekrap, brandnetel en wouw** uitsluitend toegestaan indien gebruik gemaakt wordt van minimaal **50%** driftreducerende doppen. Deze doppen dienen altijd te worden gecombineerd met het gebruik van een kantdop.

Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is toepassing van het middel in de teelt van **bieten** uitsluitend toegestaan indien gebruik gemaakt wordt van minimaal **75%** driftreducerende doppen. Deze doppen dienen altijd te worden gecombineerd met het gebruik van een kantdop.

In verband met residuen in volggewassen mogen in de eerstvolgende 90 dagen na toepassen geen koolzaad, bieten en granen worden geteeld en in de eerstvolgende 125 dagen na toepassen geen andere gewassen voor consumptie of voederdoeleinden worden geteeld.

Bij het mislukken van de teelt kunnen problemen verwacht worden bij de teelt van de vervanggewassen boon, erwt, aardappel, klaver, sla, schorseneer, witlof, cichorei, wortel, ui, spinazie (deze lijst is niet volledig).