

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

Actueel WG van het middel AAKO GOLTIX 700 SC

W.3

24 maart 2017

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen.
Bieten	voor opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	1,5-3 L/ha ²	1 per teeltcyclus	5 L/ha	-
	rond opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	2 L/ha ³	1 per teeltcyclus		14 ⁷
	na opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	0,5-1 L/ha ⁴	6 per teeltcyclus		5 ⁸
Afrikaantjes (<i>Tagetes</i>) als groenbemester	na opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	0,5-2 L/ha ²	5 per teeltcyclus	5 L/ha	7
Rode biet	voor opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	1,5-3 L/ha ²	1 per teeltcyclus	5 L/ha	-
	rond opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	2 L/ha ³	1 per teeltcyclus		14 ⁷
	na opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	0,5-1 L/ha ⁴	6 per teeltcyclus		5 ⁸

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen.
Bloembol- en bloemknolgewassen m.u.v. lelie (onbedekte teelt)	rond opkomst en na opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	2 L/ha	2 per teeltcyclus	4 L/ha	7
Lelie (onbedekte teelt)	rond opkomst of na opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	2 L/ha	1 per teeltcyclus	5 L/ha	7
	na opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	0,5-1 L/ha ⁵	10 per teeltcyclus		
Lelie (bedekte teelt)	rond opkomst en na opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden en straatgras ¹	1-2 L/ha ⁶	2 per 12 maanden	4 L/ha	7

¹ Straatgras (*Poa annua*)

² Dosering afhankelijk van de grondsoort.

³ In combinatie met 2 liter per ha minerale of plantaardige olie.

⁴ LDS in combinatie met toegelaten middelen

⁵ LDS in combinatie met 5 liter per ha minerale of plantaardige olie.

⁶ De lage dosering in combinatie met toegelaten middelen.

⁷ Het minimum interval tussen de rond opkomst behandeling en de voorgaande voor opkomst behandeling is 14 dagen.

⁸ Het minimum interval tussen de eerste na opkomst behandeling en de voorgaande rond opkomst behandeling en tussen na opkomst behandelingen onderling is 5 dagen.

Toepassingsvoorwaarden

Om de zoogdieren te beschermen is toepassing in de onbedekte teelt van lelies uitsluitend toegestaan voor het koppen van het gewas of voor volledige bloei (uiterlijk tot BBCH 65).

Om niet tot de doelsoorten behorende terrestrische planten te beschermen is toepassing in onbedekte teelten uitsluitend toegestaan wanneer gebruik wordt gemaakt van minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen en kantdoppen.

Mislukt een bietengewas door welke oorzaak dan ook (bijv. vorstschade of insectenvraat) en is AAKO GOLTIX 700 SC toegepast dan zijn de mogelijkheden voor een volggewas beperkt:

- zonder grondbewerking kunnen bieten of krotten worden gezaaid;
- na ploegen kunnen maïs en aardappelen worden geteeld;

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof met amitron. Met amitron behoort tot de triazonen. De Hrac code is C1.

Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.