

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

Actueel WGGa van het middel Fusilade Max

W.4

18 november 2016

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Veiligheidstermijn in dagen
Aardappel	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 2 L/ha	1 per teeltcyclus	75
Bieten	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per teeltcyclus	56
Peulvruchten	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per teeltcyclus	90
Roodzwenkgras	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per 12 maanden	49
Hardzwenkgras	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per 12 maanden	49
Blauwmaanzaad	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per teeltcyclus	-
Karwij	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per teeltcyclus	-
Koolzaad	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per teeltcyclus	-
Veldbonen (voor ensilage)	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per teeltcyclus	90
Cichorei	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per teeltcyclus	56
Witlof (pennenteelt)	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per teeltcyclus	56
Appel	Strokenbehandeling	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per 12 maanden	28
Peer	Strokenbehandeling	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per 12 maanden	28
Kers (onbedekte teelt)	Strokenbehandeling	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per 12 maanden	28
Pruim (onbedekte teelt)	Strokenbehandeling	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per 12 maanden	28
Aardbei (onbedekte teelt)	Over het gewas	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per teeltcyclus	42
Aalbes (onbedekte teelt)	Tussen het gewas	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per 12 maanden	90
Kruisbes	Tussen het gewas	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per 12 maanden	90

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Veiligheidstermijn in dagen
Braam- en framboosachtigen (<i>Rubus</i> spp.) (onbedekte teelt)	Tussen het gewas	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per 12 maanden	45
Boon met peul (onbedekte teelt)	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per teeltcyclus	56
Erwt zonder peul	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per teeltcyclus	56
Wortelen	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 2 L/ha	1 per teeltcyclus	56
Koolraap	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per teeltcyclus	56
Rode biet	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per teeltcyclus	56
Knolselderij (onbedekte teelt)	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per teeltcyclus	56
Schorseneer	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per teeltcyclus	56
Uien	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per teeltcyclus	28
Sjalotten	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per teeltcyclus	28
Asperge (onbedekte teelt)	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per teeltcyclus	-
Bloembollen en bloemknollen m.u.v. tulpen (onbedekte teelt)	Na opkomst	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per teeltcyclus	-
Boomkwekerijgewassen (onbedekte teelt)	Over het gewas	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per 12 maanden	-
Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)	Over het gewas	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per 12 maanden	-
Houtige beplanting	Over het gewas	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per 12 maanden	-
Akkerranden	Over het gewas	grasachtige onkruiden	1 – 3 L/ha	1 per 12 maanden	-

Het middel dient te worden toegepast in 400-500 liter water per hectare

Toepassingsvoorwaarden

Toepassing is slechts toegestaan in de periode van 1 april tot en met 30 september.

Voor de teelt van aardbei (onbedekte teelt), aalbes (onbedekte teelt), kruisbes, braam- en framboosachtigen (*Rubus* spp.) (onbedekte teelt), geldt dat de toepassing alleen is toegestaan vóór de bloei en/of na de oogst

12519 N

Voor de teelt van boon met peul (onbedekte teelt), en erwt zonder peul geldt dat de toepassing alleen is toegestaan vóór de bloei

Voor asperge (onbedekte teelt) geldt dat de toepassing uitsluitend is toegestaan na de oogst.

Het middel is gevaarlijk voor roofmijten. Vermijd onnodige blootstelling.