

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

Actueel WG van het middel Tafari

22 februari 2018

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten insectenbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgj juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal kg middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Lelie	gewasbehandeling	Bladluis ¹	0,2 kg/ha	0,2 kg/ha	2 per 12 maanden	0,4 kg/ha per 12 maanden	7
Bloemisterijgewassen (bedekte teelt)	gewasbehandeling	Bladluis ²	0,02% (20 gram per 100 liter water)	0,24 kg/ha	2 per 12 maanden	2,16 kg/ha per 12 maanden	7
		Wittevlieg ³	0,06% (60 gram per 100 liter water)	0,72 kg/ha	3 per 12 maanden		
Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)	gewasbehandeling	Bladluis ⁴	0,3 kg/ha	0,3 kg/ha	3 per 12 maanden	0,9 kg/ha per 12 maanden	7
Boomkwekerijgewassen (bedekte teelt)	gewasbehandeling	Bladluis ²	0,02% (20 gram per 100 liter water)	0,2 kg/ha	3 per 12 maanden	0,6 kg/ha per 12 maanden	7
Boomkwekerijgewassen (onbedekte teelt)	gewasbehandeling	Bladluis ⁴	0,3 kg/ha	0,3 kg/ha	3 per 12 maanden	0,9 kg/ha per 12 maanden	7
Vaste plantenteelt (bedekte teelt)	gewasbehandeling	Bladluis ²	0,02% (20 gram per 100 liter)	0,2 kg/ha	3 per 12 maanden	0,6 kg/ha per 12 maanden	7

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximale dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal kg middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
			water)				
Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)	gewasbehandeling	Bladluis ⁴	0,3 kg/ha	0,3 kg/ha	3 per 12 maanden	0,9 kg/ha per 12 maanden	7

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is bij lagere dosering niet beoordeeld.

¹ Katoenluis (*Aphis gossypii*)

² Katoenluis (*Aphis gossypii*), Groene perzikluis (*Myzus persicae*), Rode luis (*Myzus nicotianae*), Aardappeltopluis (*Macrosiphum euphorbiae*), Boterbloemluis (*Aulacorthum solani*), Gele rozenluis (*Rhodobium porosum*)

³ Kaswittevlug (*Trialeurodes vaporariorum*)

⁴ Katoenluis (*Aphis gossypii*), Groene perzikluis (*Myzus persicae*), rode luis (*Myzus nicotianae*), Aardappeltopluis (*Macrosiphum euphorbiae*).

Overige toepassingsvoorwaarden

Dit middel is gevaarlijk voor bijen en hommels. Niet toegestaan is toepassing op in bloei staande gewassen of in niet-bloeiende planten wanneer deze actief bezocht worden door bijen en hommels. Gebruik is wel toegestaan op in bloei staande gewassen onder glas, mits er geen bijen en hommels in de kas aanwezig zijn. Bijen en hommelskasten sluiten, afdekken of verwijderen tijdens toepassing. Bijenvolken (her)introduceren 2-3 dagen na toepassing van Tafari.

Dit middel is schadelijk voor niet-doelwit arthropoden. Vermijd onnodige blootstelling.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof pymetrozine. De IRAC code is 9, subgroep B. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van het resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen op te volgen.