

## HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

**BIJLAGE I** bij het besluit d.d. 11 december 2012 tot wijziging van de toelating van het middel TRAMAT 500, toelatingnummer 12521 N

### Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel door middel van een na opkomst toepassing in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassings-gebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Bieten	Eenjarige onkruiden	0,3 l/ha <sup>1</sup>	2 per teeltcyclus	1,6 l/ha per teeltcyclus	10
		1 l/ha <sup>2</sup>	1 per teeltcyclus		-
Engels raaigras en Italiaans raaigras	Eenjarige onkruiden	3 – 3,5 l/ha <sup>3</sup>	1 per 12 maanden	3,5 l/ha per 12 maanden	-

<sup>1</sup> in combinatie met 2 L/ha van een middel op basis van fenmedifam (ong.160 g fenmedifam/L). Het middel dient te worden toegepast met 200-250 liter water/ha

<sup>2</sup> in combinatie met 5 L/ha van een middel op basis van fenmedifam (ong.160 g fenmedifam/L). Het middel dient te worden toegepast met 250-300 liter water/ha

<sup>3</sup> Het middel dient te worden toegepast met 200-300 liter water/ha

Het gebruik in de graszaadteelt en in de graszodenteelt is toegestaan op basis van een “derdenuitbreiding”. Deze “derdenuitbreiding” is aangevraagd door de Stichting Trustee Bijzondere Toelatingen. Voor deze uitbreiding is geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per 12 maanden
Graszaadteelt	Voor opkomst	Eenjarige onkruiden	0.5 – 2 l/ha <sup>1 2</sup>	1	3,5 l/ha
Graszaadteelt (m.u.v. Engels en Italiaans raaigras, zie tabel boven)	Na opkomst	Eenjarige onkruiden	2 – 3,5 l/ha <sup>1 2</sup>	1	
Graszodenteelt	Voor opkomst	Eenjarige onkruiden	0,5 - 1 l/ha <sup>1 2</sup>	1	2 l/ha
	Na opkomst	Eenjarige onkruiden	2 l/ha <sup>2</sup>	1	

<sup>1</sup> Dosering is afhankelijk van de te bestrijden onkruiden.

Bij bekend gevoelige grassoorten dienen lagere doseringen te worden gebruikt.

<sup>2</sup> Het middel dient te worden toegepast met 200-300 liter water/ha

### **Toepassingsvoorwaarden**

Gras en hooi van met TRAMAT 500 behandelde graszaadpercelen mag niet worden vervoerd.

#### Volggewassen

In een normale vruchtopvolging zijn er geen beperkingen ten aanzien van volggewassen. Wel dient altijd een kerende grondbewerking te worden uitgevoerd alvorens volggewassen kunnen worden verbouwd.

#### Vervanggewassen

Bij mislukken van een teelt waarin TRAMAT 500 werd toegepast kunnen de volgende gewassen na kerend ploegen worden gezaaid of geplant: suiker- en voederbieten, maïs, bruine bonen, tuinbonen, raaigrassen, witlof, erwten, spinazie, knolselderij, wortelen, zaai- en plantuien. In deze vervanggewassen dan geen middelen op basis van ethofumesaat toepassen.