

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

7 augustus 2015

Actueel WG van het middel Kontakt 320 SC, 12899 N

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Bieten	Na opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden	3 L/ha	1x per teeltcyclus	3 L/ha per teeltcyclus	-
			1,5 L/ha	2x per teeltcyclus		4
			1,5-3 L/ha ¹	1x per teeltcyclus		-
			0,25-0,5 L/ha ²	6 x per teeltcyclus		7
Aardbei (onbedekte teelt)	Na opkomst of na uitplanten	eenjarige breedbladige onkruiden	3 L/ha	1x per 12 maanden	3 L/ha per 12 maanden	-
Rode biet	Na opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden	2-3 L/ha	1x per teeltcyclus	3 L/ha per teeltcyclus	-
			1,5 L/ha ³	1x per teeltcyclus		
Iris (onbedekte teelt)	Na opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden	3 L/ha	1x per teeltcyclus	3 L/ha per teeltcyclus	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Boomkwekerij gewassen (gezaaid) (onbedekte teelt)	Na opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden	3 L/ha	1x per 12 maanden	3 L/ha per 12 maanden	-
Bloemenzaadteelt (onbedekte teelt)	Na opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden	1,5-3 L/ha	1x per 12 maanden	3 L/ha per 12 maanden	-
Tagetes	Na opkomst	eenjarige breedbladige onkruiden	1-2 L/ha ⁴	2x per 12 maanden	3 L/ha per 12 maanden	7

¹ in combinatie met 1,5 l Goltix SC

² in LDS systeem met toegelaten middelen + 0,5-1 l minerale olie (850 g/l)

³ in combinatie met 3 liter Goltix SC

⁴ in combinatie met 1-2 liter Goltix SC

In iris dient Kontakt 320 SC toegepast te worden in 500 liter water per hectare, in aardbei in 400-500 liter water per hectare. Voor de overige toepassingen geldt dat het middel toegepast dient te worden in 200-300 liter water per ha.

Toepassingsvoorwaarden

Op percelen die grenzen aan oppervlaktewater is toepassing uitsluitend toegestaan met gebruik van een spuitdop uit de driftreductieklasse van 75%. Deze restrictie is niet van toepassing op het lage doseringen systeem in suiker- en voederbieten.

In bieten en rode biet dient het middel voor het sluiten van het gewas toegepast te worden.

In aardbeien dient Kontakt 320 SC toegepast worden in het voorjaar voor de bloei van de aardbeien of na de oogst of na het uitplanten in de zomer, zodra de planten goed zijn aangeslagen.

In boomkwekerijgewassen, bloemzadenteelt van *Amaranthus* en *Phlox drummondii* en in iris kan de toepassing tijdelijke groeiremming veroorzaken.

12899 N

In de bloemenzaadteelt wordt het aanbevolen om eerst een proefbespuiting uit te voeren.

In Tagetes kan enige bladverbranding optreden, dit herstelt echter snel.