

**BIJLAGE I** bij het besluit d.d. 19 december 2012 tot wijziging van de toelating van het middel Cliophar 100 SL, toelatingnummer 11955 N

**Wettelijk Gebruiksvoorschrift**

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel door middel van een na opkomst toepassing in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassings-gebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Bieten	na opkomst	breedbladige onkruiden	1,2 l/ha	1 x per teeltcyclus	1,5 l/ha per teeltcyclus	-
		kleine eenjarige breedbladige onkruiden	0,5 l/ha*	3 x per teeltcyclus		7
Maïs	na opkomst	breedbladige onkruiden	1,2 l/ha	1 x per teeltcyclus	1,2 l/ha per teeltcyclus	-
Koolzaad	na opkomst	breedbladige onkruiden	1,2 l/ha	1 x per teeltcyclus	1,2 l/ha per teeltcyclus	-
Vlas (lijnzaad en vezelvlas)	na opkomst	breedbladige onkruiden	1,0 l/ha	1 x per teeltcyclus	1,0 l/ha per teeltcyclus	-
Aardbei (onbedekte teelt)	na oogst	breedbladige onkruiden	1,0 l/ha	1 x per 12 maanden	1,0 l/ha per 12 maanden	-
	na uitplanten	kleine eenjarige breedbladige onkruiden	0,5 l/ha*	2 x per teeltcyclus		7
Sluitkoolachtigen (onbedekte teelt)	na uitplanten of na opkomst	breedbladige onkruiden	1,0 l/ha	1 x per teeltcyclus	1,0 l/ha per teeltcyclus	-
		kleine eenjarige breedbladige onkruiden	0,5 l/ha*	2 x per teeltcyclus		10
Bloemkoolachtigen (onbedekte teelt)	na uitplanten of na opkomst	breedbladige onkruiden	1,0 l/ha	1 x per teeltcyclus	1,0 l/ha per teeltcyclus	-
		kleine eenjarige breedbladige onkruiden	0,5 l/ha*	2 x per teeltcyclus		10

\*in LDS-systeem in combinatie met toegelaten middelen

Het gebruik in de teelt gewassen voor bloemenzaad, de onbedekte teelt van meekrap en onbedekte teelt van brandnetel is beoordeeld conform de “vereenvoudigde uitbreidingsprocedure”. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassings-gebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Bloemenzaad-teelt (onbedekte teelt)	voor opkomst of na opkomst	breedbladige onkruiden	0,75-1,2 l/ha	1	1,2 l/ha	-
		kleine éénjarige breedbladige onkruiden	0,5 l/ha*	3	1,5 l/ha	7
Meekrap (onbedekte teelt)	na uitplanten	Breedbladige onkruiden	1,2 l/ha	1	1,2 l/ha	-
		kleine éénjarige breedbladige onkruiden	0,5 l/ha*	3	1,5 l/ha	7
Brandnetel (onbedekte teelt)	na opkomst	breedbladige onkruiden	0,75-1,2 l/ha	1	1,2 l/ha	-

\*in LDS-systeem in combinatie met toegelaten middelen

### Toepassingsvoorwaarden

Om het grondwater te beschermen mag dit product tussen 1 september en 1 maart niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden

Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is toepassing op perceelsranden die niet grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van driftarme spuitdoppen in combinatie met een kantdop.

Bij het mislukken van de teelt kunnen problemen verwacht worden bij de teelt van de vervanggewassen boon, erwt, aardappel, klaver, sla, schorseneer, witlof, chicorei, wortel, ui, spinazie (deze lijst is niet volledig).