

1 mei 2015

Actueel WG van het middel Oblix 200 EC, 10568 N

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Bieten	na opkomst	eenjarige onkruiden	1,5 l/ha ¹	2	4 l/ha per teeltcyclus	10
			2,5 l/ha ²	1		-
			0,5 - 1 l/ha ³	8		7
Graszaadteelt van Engels- en Italiaans raaigras	over het gewas	eenjarige onkruiden	7,5 - 10 l/ha	1	10 l/ha per 12 maanden	-

¹ In combinatie met 3,5 l/ha fenmedifam (160 g/l).

² In combinatie met 5 l/ha fenmedifam (160 g/l).

³ In LDS-systeem met toegelaten middelen.

Het gebruik in de graszaadteelt (met uitzondering van Engels en Italiaans raaigras) en de graszodenteelt is op basis van een "vereenvoudigde uitbreiding". Er is voor deze uitbreiding geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Het gebruik in de teelt van cichorei is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassing geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in dit toepassingsgebied, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus of per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Graszaadteelt met uitzondering van Engels en Italiaans raaigras	over het gewas	eenjarige onkruiden	10 l/ha	1 per teeltcyclus	10 l/ha per teeltcyclus	-
Graszodenteelt	over het gewas	eenjarige onkruiden	2,5 - 10 l/ha	1 per 12 maanden	10 l/ha per 12 maanden	-
Cichorei	na opkomst	eenjarige onkruiden	0,25-0,5 l/ha ¹	4 per teeltcyclus	1 l/ha per teeltcyclus	7

¹ In LDS-systeem met toegelaten middelen.

Dit middel dient te worden toegepast in 200-300 liter water per ha.

Toepassingsvoorwaarden

Na gebruik in de graszaadteelt, het gras/hooi niet vervoederen.

De totale dosering in één seizoen mag niet hoger zijn dan 2 kg ethofumesaat (als werkzame stof) per hectare.

Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is toepassing in de graszaadteelt en graszodenteelt uitsluitend toegestaan indien gebruikt wordt gemaakt van driftarme spuitdoppen.

Voor bieten geldt dat tijdelijk enige gewasbeschadiging op kan treden, vooral bij kleine bietenplantjes.

Om schade te voorkomen als gevolg van eventuele residuen van ethofumesaat in de grond moet voor het zaaien of planten eerst kerend worden geploegd, bijvoorbeeld bij een nateelt van wintergranen of bij een mislukte teelt. Bij mislukken van een gewas waarin dit middel werd toegepast kunnen de volgende gewassen na kerend ploegen gezaaid of geplant worden: suiker- en voederbieten, maïs, bruine bonen, tuinbonen, raaigrassen, erwten, spinazie, knolselderij, wortelen, zaai- en plantuien.