

**HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN**

29 januari 2016

Actueel WG van het middel Pilot, 12279 N

**Wettelijk Gebruiksvoorschrift**

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Veiligheidstermijn in dagen
Consumptie- en zetmeelaardappel	Na opkomst	eenjarige grassen en kweek <sup>1</sup>	1-3 l/ha <sup>2</sup>	1 per teeltcyclus	60
Bieten	Na opkomst	eenjarige grassen, graanopslag en kweek <sup>1</sup>	1-3 l/ha <sup>2</sup>	1 per teeltcyclus	-
Droog te oogsten erwten	Na opkomst	eenjarige grassen, graanopslag en kweek <sup>1</sup>	1-3 l/ha <sup>2</sup>	1 per teeltcyclus	21
Zwenkgras (met uitzondering van Rietzwenkgras)	Over het gewas	eenjarige grassen	1-1,5 l/ha <sup>2</sup>	1 per 12 maanden	-
Engels raagrass en veldbeemdgras	Over het gewas	graanopslag	0.2 l/ha <sup>2</sup>	1 per 12 maanden	-
Winterkoolzaad	Na opkomst	eenjarige grassen, graanopslag en kweek <sup>1</sup>	1-3 l/ha <sup>2</sup>	1 per teeltcyclus	-
Aardbei (onbedekte teelt)	Over het gewas	graanopslag	1 l/ha <sup>2</sup>	1 per teeltcyclus	21
Doperwt	Na opkomst	eenjarige grassen en graanopslag	1-1,5 l/ha <sup>2</sup>	1 per teeltcyclus	21
Prei (onbedekte teelt)	Na opkomst of na uitplanten	eenjarige grassen, graanopslag en kweek <sup>1</sup>	1-3 l/ha <sup>2</sup>	1 per teeltcyclus	21

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden	Veiligheidstermijn in dagen
Bloembol- en bloemknolgewassen met uitzondering van tulp (onbedekte teelt)	Over het gewas	eenjarige grassen, graanopslag en kweek <sup>1</sup>	1-3 l/ha <sup>2</sup>	1 per teeltcyclus	-
Boomkwekerijgewassen (onbedekte teelt)	Tussen het gewas	eenjarige grassen en kweek	1-3 l/ha <sup>2</sup>	1 per 12 maanden	-
Houtige beplanting	Tussen het gewas	eenjarige grassen en kweek	1-3 l/ha <sup>2</sup>	1 per 12 maanden	-

<sup>1</sup> *Elytrigia repens*

<sup>2</sup> Dosering is afhankelijk van het te bestrijden organisme. Voor bieten geldt dat bij tankmenging de dosering verlaagd kan worden.

Pilot bevat geen uitvloeier. In aardbeien moet in verband met gewasveiligheid het gebruik van uitvloeiers worden afgeraden.

Voor de overige gewassen moet voor een goede bedekking steeds uitvloeier worden toegevoegd aan de spuitoplossing.

Het middel dient te worden verspoten met minimaal 400 liter water per hectare.

Bij toediening in het standaard geadviseerde tankmengsel in bieten dient geen extra uitvloeier te worden toegevoegd. De hoeveelheid spuitvloeistof is in dat geval 100-300 liter per hectare.

### Toepassingsvoorwaarden

In consumptie- en zetmeelaardappelen kunnen na toepassing op het gewas chlorotische vlekjes ontstaan. Deze worden snel overgroeid door nieuw gevormd blad en hebben in het algemeen geen invloed op de opbrengst.

In conservenerwten is het mogelijk dat chlorose optreedt in het jonge bladweefsel; deze lokale symptomen hebben geen invloed op de verdere ontwikkeling van het gewas.

Voor boomkwekerijgewassen en houtige beplanting geldt dat Pilot zo zodanig dient te worden toegepast dat bladeren van het gewas zo min mogelijk worden geraakt.