

4 augustus 2017

**Wettelijk Gebruiksvoorschrift**

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassings-gebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus
Bieten	Na opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	2 L/ha	3	7 dagen	6 L/ha
	Voor opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	3 L/ha	1	5 dagen <sup>2</sup>	
	Na opkomst		1 L/ha <sup>1</sup>	3		

<sup>1</sup> in LDS-systeem

<sup>2</sup> Minimaal 10 dagen tussen voor opkomst en de 1<sup>e</sup> na opkomst behandeling

Het gebruik in de teelt van lelie, gladiool en pioen is beoordeeld conform artikel 51 EC 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen
Lelie (vermeerderingsteelt, onbedekt)	Na-opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,7 – 1 L/ha	6	5 dagen

Toepassingsgebied	Type toepassing	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen
Gladiool (vermeerderingsteelt, onbedekt)	Na-opkomst	Eenjarige breedbladige onkruiden	0,7 – 1 L/ha	6	5 dagen
Pioen (snijbloemen, onbedekt)	Na-opkomst, onder het gewas	Eenjarige breedbladige onkruiden	1,5 L/ha	3	5 dagen

### Toepassingsvoorwaarden

Draag geschikte handschoenen bij werkzaamheden aan behandeld gewas.

Mislukt een bietengewas door welke oorzaak dan ook (bijv. vorstschade of insectenvraat) en is Goltix Queen toegepast dan zijn de mogelijkheden voor een volggewas beperkt:

- zonder grondbewerking kunnen bieten of krotten worden gezaaid;
- na ploegen kunnen maïs en aardappelen worden geteeld;
- na ploegen en een wachttijd van 2 maanden na de laatste toepassing kunnen raigras en klaver worden geteeld.

Om de niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is toepassing uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van minimaal 50% driftreducerende spuitdoppen

Om het grondwater te beschermen mag dit product in de teelt van bieten niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden.

Om het grondwater te beschermen mag dit product in de teelt van lelie en gladiolen in de periode 1 september tot 1 maart niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden

### Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stoffen metamitron en quinmerac.

Metamitron behoort tot de triazinonen de Hrac code is C1, Quinmerac behoort tot de quinolinecarboxylic-zuren de Hrac code is O.

Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.